



天然ミネラルセリサイト

セリファーム

セリファームは天然鉱物を使用した、安全で作物の成長に役立つ環境に優しい
土壌改良資材、作物生育用資材です。有機栽培にもおすすめします。

※本資材は農薬・化学肥料に分類されるものでなく、環境に優しい農産物生産のために利用できる土壌改良資材、作物生育用資材です。
効果・効能は保証するものではありませんが、成分と含量は記載のとおりです。
※写真及びコメントは個人の感想であり、効果・効能を示すものではありません。

枯死寸前

株元へ施用するだけで樹勢回復が期待できます。



セリファーム粒状を施用



年2回株元へセリファーム粒状を施用するだけ。


樹皮の腐りに

水練りして塗るだけ



着色

実が硬く、着色に期待！



雨等に流されないよう処置をして下さい。



凍霜害

サビ果防止、果面保護に！

日焼

日焼軽減対策に！

野菜でもこんなに違います



霜害から果樹の病気の
予防に期待できます。



着色はもちろん、直射日光、高温
時の果樹の保護に期待できます。



従来通り



セリファーム粒状施用

石灰の代わりにセリファーム
粒状を施用しただけでこんな
に違います。



セリファーム 粒状

有機JAS規格別表1適合資材

■使用方法

作物名	面積	施用量	施用時期	効果
穀物類	10a	3~5袋	耕耘前・収穫後	土壌酸度調節 珪酸質供給 土壌の物理性改善 土壌の保水効果
果樹類	1本当り	1~3kg	春・秋 ^(注1)	
	10a	3~5袋	春・秋	
果菜類、葉菜類	10a	3~5袋	耕耘前・収穫後	
根菜類	10a	3~5袋	耕耘前・収穫後	
育苗種	上土1t当り	0.5袋		

(注1) 生育期間においても樹勢が弱いと感じた時施用して下さい。(随時) ※他アルカリ性製品との混用は出来るだけおやめ下さい。

■保証表示

1. 資材の種類：土壌改良資材 2. 重量：15kg 3. 主要原材料：絹雲母

成分名	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	MnO	強熱減量
含量(%)	70.7	15.2	0.91	0.89	0.53	3.11	2.09	0.24	0.02	2.99

地方独立行政法人 青森県産業技術センター弘前地域研究所による分析



JASOM-191203

セリファーム ゴールド (葉面散布用)

有機JAS規格別表1適合資材

■使用方法

	使用時期	使用量
果樹類	発芽後から2~3回 落花直後から3~4回	500倍 ↓ 1000倍
穀物類	育苗から収穫まで3~4回	
果菜類	育苗から2回 定植後10~15日間隔	
根菜類	芽が5cm位になった時 10~15日間隔	
葉菜類	10日間隔	
特作物	15日間隔	
灌注	作物に関係なく300坪当たり本製品1kg (1パック) 使用	

※他カルシウム剤が不要。アルカリ性農薬との混用禁止。※他製品との混用の際は最初に本製品を水とよく混ぜた後、他製品を入れてください。

■保証表示

1. 資材の種類：作物生育用資材 2. 重量：1kg 3. 主要原材料：絹雲母

成分名	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	MnO	強熱減量
含量(%)	39.1	9.22	23.5	0.54	0.12	1.95	1.05	0.12	0.01	21.2

地方独立行政法人 青森県産業技術センター弘前地域研究所による分析



JASOM-200702

セリファーム グリーン (葉面散布用)

有機JAS規格別表1適合資材

■使用方法

	使用時期	使用量
果菜類	育苗で2回	500倍 ↓ 1000倍
	定植後10~15日間隔	
根菜類	芽が5cm位になった時	
	10~15日間隔	
葉菜類	10日間隔	
特作物	15日間隔	
灌注	作物に関係なく300坪当たり本製品1kg (1パック) 使用	

※他カルシウム剤が不要。アルカリ性農薬との混用禁止。※他製品との混用の際は最初に本製品を水とよく混ぜた後、他製品を入れてください。

■保証表示

1. 資材の種類：作物生育用資材 2. 重量：1kg 3. 主要原材料：絹雲母

成分名	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	MnO	強熱減量
含量(%)	50.6	11.9	14.5	0.68	0.14	2.75	1.32	0.16	0.01	14.2

地方独立行政法人 青森県産業技術センター弘前地域研究所による分析



JASOM-200703

セリファーム ブルーS (葉面散布用)

有機JAS規格別表1適合資材

■使用方法

	使用時期	使用量
果樹類	収穫4~6週間前から10~15日間隔	500倍 ↓ 1000倍
穀物類	育苗から収穫まで3~4回	
果菜類	育苗から2回 定植後10~15日間隔	
根菜類	芽が5cm位になった時 10~15日間隔	
葉菜類	10日間隔	
特作物	15日間隔	
灌注	作物に関係なく200坪当たり本製品1本使用	

※他製品との混用の際は最初に本製品を水とよく混ぜた後、他製品を入れてください。

■保証表示

1. 資材の種類：作物生育用資材 2. 容量：1ℓ 3. 主要原材料：絹雲母

成分名	SiO ₂	Al ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	MnO	強熱減量
含量(%)	3.85	0.75	0.02	0.01	0.004	0.04	0.08	0.01	0.16	98.9

地方独立行政法人 青森県産業技術センター弘前地域研究所による分析



JASOM-200704

販売元

“CHOEI”
有限会社 チョウエイ

〒036-1502
青森県弘前市大字黒滝字一ノ川瀬93-5
TEL 0172-84-2191
FAX 0172-84-2192
http://www.choei-hp.co.jp/

供給



Fruit
Plant

株式会社
福島天香園

くだもの世界の
新しい未来へ

〒960-2156 福島県福島市荒井字上町裏2番地
TEL : 024-593-2231 FAX : 024-593-2234
http://www.fukuten.com E-mail : fruit@fukuten.com